

**IMPORTANT - CARTE DE MISE EN GARDE**

**Abacavir/Lamivudine Teva 600 mg/300 mg, comprimé pelliculé**  
(abacavir/lamivudine)

**Conservez cette carte sur vous en permanence**

Abacavir/Lamivudine Teva contient de l'abacavir. Certains patients prenant Abacavir/Lamivudine Teva peuvent développer une réaction d'hypersensibilité (réaction allergique grave) qui **peut menacer le pronostic vital** en cas de poursuite du traitement. **CONTACTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN** qui vous indiquera si vous devez arrêter de prendre Abacavir/Lamivudine Teva si :

- 1. vous présentez une éruption cutanée OU,**
- 2. vous présentez un ou plusieurs symptômes appartenant à au moins DEUX des catégories suivantes :**
  - fièvre ;
  - essoufflement, mal de gorge ou toux ;
  - nausées ou vomissements ou diarrhée ou douleurs abdominales ;
  - fatigue sévère ou courbatures ou sensation de malaise général.

**(voir au verso)**

Si vous avez arrêté le traitement par Abacavir/Lamivudine Teva en raison de cette réaction, **VOUS NE DEVEZ JAMAIS REPRENDRE** Abacavir/Lamivudine Teva, ni tout autre médicament contenant de l'abacavir, car cela peut entraîner, **dans les heures qui suivent**, une chute de votre pression artérielle menaçant le pronostic vital, voire le décès.

Contactez immédiatement votre médecin si vous suspectez une réaction d'hypersensibilité à Abacavir/Lamivudine Teva. Notez ci-dessous les coordonnées de votre médecin :

Docteur : ..... Tél. : .....

**En cas d'absence de celui-ci, vous devez contacter immédiatement un autre médecin pour un avis médical (par exemple le service des urgences de l'hôpital le plus proche).**

Pour les demandes d'informations générales concernant Abacavir/Lamivudine Teva, contactez Teva Santé au **0 800 513 411** 