

# Médicaments à base de fluconazole en poudre pour suspension buvable (TRIFLUCAN® et ses génériques)

## La cuillère-mesure est remplacée par une seringue orale

Le fluconazole (TRIFLUCAN® et ses génériques) en poudre pour suspension buvable permet de traiter les infections dues à des champignons. Il existe deux spécialités de concentrations différentes qui s'appellent désormais **TRIFLUCAN® 10 mg/mL et ses génériques et TRIFLUCAN® 40 mg/mL**.

Depuis le 25 juin 2018, tous les médicaments contenant du fluconazole (sous forme de poudre pour suspension buvable) ont un nouveau dispositif d'administration : **une seringue pour administration orale de 5 mL, graduée par paliers de 0,1 mL ou 0,2 mL selon les spécialités, au lieu d'une cuillère-mesure de 5 mL**.

La seringue orale permet d'administrer directement dans la bouche une quantité plus précise du médicament.

→ **SI VOUS AVEZ DÉJÀ PRIS CE MÉDICAMENT**, sachez que le dosage est écrit différemment mais la concentration du produit reste la même :

- le dosage à 50 mg/5 mL s'écrit désormais 10 mg/mL
- le dosage à 200 mg/5 mL s'écrit désormais 40 mg/mL.

Votre médecin avait l'habitude de vous le prescrire en nombre de cuillères ou en milligrammes (mg), il vous prescrira désormais la dose à prendre en millilitres (mL).

→ **RESTEZ VIGILANT :**

- Votre pharmacien vous indiquera sur la boîte du médicament **la dose à prendre en mL et la fréquence des prises. En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.**
- La seringue orale fournie dans la boîte est conçue uniquement pour ce médicament. Ne l'utilisez pas pour administrer un autre médicament et n'utilisez pas la seringue d'un autre médicament pour administrer le fluconazole.

En cas de perte de la seringue orale ou de doute sur son utilisation, demandez conseil à votre pharmacien.

→ Un adaptateur est fourni dans la boîte afin de fixer la seringue sur le flacon pour prélever la suspension buvable reconstituée.

# Médicaments à base de **fluconazole en poudre** pour suspension buvable (TRIFLUCAN® et ses génériques)

## Comment reconstituer le produit et utiliser la seringue pour administration orale ?

Consultez également la notice ou demandez conseil à votre pharmacien.

### ➔ POUR RECONSTITUER LE PRODUIT :


- Tapoter le flacon pour libérer la poudre.
- Ajouter une petite quantité d'eau plate et agiter énergiquement.
- Ajouter de l'eau dans le flacon jusqu'au niveau marqué (flèche ou trait) sur le flacon,
- puis le fermer et bien agiter 1 à 2 minutes pour obtenir une suspension homogène.

### ➔ POUR ADMINISTRER LE PRODUIT :



**1**

Ouvrir le flacon  
et insérer l'adaptateur  
dans le goulot du flacon  
puis fixer la seringue orale  
dans l'adaptateur.



**2**

Retourner le flacon  
avec la seringue  
pour administration orale  
en position tête en bas  
et prélever la quantité  
de suspension prescrite  
en ml par votre médecin.  
Retirer la seringue pour  
administration orale du flacon.



**3**

Administer lentement  
le contenu de la seringue  
dans la bouche (contre  
l'intérieur de la joue).  
Le patient doit rester droit  
pendant l'administration.